

『昆虫探検図鑑1600』正誤表 (2016年4月9日現在)

現在、判明している重要な誤りについて掲載しています。お詫びして訂正いたします。

| 掲載日 | ページ | 項目 | 誤 | 正 |
|---------------------------|----------------------|------------------------------------|---|--|
| 16. 4. 9 | P.150 | 0683 ハラナガツチバチ | (和名)ハラナガツチバチ (学名) <i>Campsomeris schulthessi</i> (時期)8-11月 | (和名)シロオビハラナガツチバチ (学名) <i>Megacampsomeris schulthessi</i> (時期)3-11月 ※ハラナガツチバチは旧和名です。 |
| ※15.4.6付で掲載していた内容を修正しました。 | | | | |
| 16. 2.13 | P.165 | 0738 ルリモンハナバチ | (体長)7-10mm (時期)5-9月 | (体長)13-14mm (時期)8-11月 |
| 16. 1.20 | P.140 P.141 | 0631~0639 シリアゲムシ目全種の大きさ表記 | 体長 | 前翅長 |
| 15.12. 7 | P.132 | 0592 ヒゲナガアリスアブ | (和名)ヒゲナガアリスアブ (学名) <i>Microdon macrocerus</i> (体長)12-15mm (時期)5-6月 (分布)北海道・本州 (見つけやすさ) 北海道 △ 本州東部 △ 本州西部 △ 四国・九州以南 × (解説文) 胸部の毛は橙褐色で、腹部の毛は白色。 触角がやや長い。 | (和名)アリスアブ (学名) <i>Microdon japonicus</i> (体長)11-14mm (時期)4-6月 (分布)本州・四国・九州 (見つけやすさ) 北海道 × 本州東部 △ 本州西部 △ 四国・九州以南 △ (解説文) 暗銅色で、灰白色～淡褐色または橙褐色の短毛がある。 |
| 15.12. 7 | 写真検索 マトリックス ②表 | ハチ・ハエ・トンボ型 Mサイズ 11列目の上から3コマ目 | 0592 ヒゲナガアリスアブ | 0592 アリスアブ |
| 15. 4. 6 | P.151 | 0684 キンケハラナガツチバチ | (学名) <i>Campsomeris prismatica</i> | (学名) <i>Megacampsomeris prismatica</i> |
| 15. 1. 3 | P.310 | 1441 エダナナフシ | 中央下の写真は、エダナナフシではなくナナフシ(ナナフシモドキ)♂です。 エダナナフシ♂は、こちらの写真のようにもっと長い触角をもちます。  エダナナフシ♂(奈良県御所市 2013.9.25) | |
| 14. 8. 4 | P.34 | 0075 コヒョウモン | 上の写真(翅を開いている写真)は、コヒョウモンではなくヒョウモンチョウ♂です。 コヒョウモンは、こちらの写真のように前翅の外縁がもっと丸みを帯びます。  コヒョウモン♀(長野県諏訪市 2009.8.5) | |
| 14. 8. 2 | P.10 | ササキリ♀の部位名称 | 胸部 | 腹部 |